

INFECTION

CONTRÔLE DE L'INFECTION

6540

Définition : réduction des risques de contamination et de transmission d'agents infectieux.

► **Activités**

- Allouer la surface appropriée en mètres carrés par patient, selon les directives officielles.
- Nettoyer l'environnement de façon appropriée après le passage de chaque patient.
- Changer l'équipement de soins suivant les règles de l'établissement.
- Isoler les personnes qui ont été exposées à des maladies contagieuses.
- Mettre en œuvre les précautions indiquées en ce qui concerne l'isolement, si nécessaire.
- Maintenir les techniques indiquées dans les cas d'isolement, si nécessaire.
- Limiter le nombre de visiteurs, si nécessaire.
- Enseigner au personnel soignant les techniques les plus récentes pour le lavage des mains.
- Enseigner au patient les techniques pour le lavage approprié des mains.
- Demander aux visiteurs de se laver les mains en pénétrant et en quittant la chambre du patient.
- Utiliser un savon antibactérien pour le lavage des mains, si nécessaire.
- Laver ses mains avant et après chaque activité de soins.
- Mettre en œuvre les précautions universelles.
- Porter des gants comme l'exigent les règles universelles.
- Porter une blouse ou des vêtements chirurgicaux lors de la manipulation de matériel infectieux.
- Porter des gants stériles, si nécessaire.
- Désinfecter la peau du patient avec un agent antibactérien, si nécessaire.
- Raser la région concernée et la recouvrir de champs stériles, tel qu'il est indiqué, en préparation de manœuvres invasives ou d'une chirurgie.
- Maintenir un environnement aseptique optimal au chevet du patient lors de l'insertion de lignes centrales.
- Maintenir un environnement aseptique lors du changement du tube et des bouteilles d'alimentation parentérale totale.
- Maintenir un système en circuit fermé lors du monitoring hémodynamique invasif.
- Changer l'emplacement de la ligne intraveineuse périphérique et de la ligne centrale, ainsi que les pansements, suivant les directives officielles.
- Veiller à la manipulation aseptique de toutes les lignes intraveineuses.
- Veiller à utiliser une technique appropriée pour les soins de la blessure.
- Utiliser un cathétérisme périodique afin de réduire les risques d'infection de la vessie.
- Demander au patient de prélever des échantillons d'urine du milieu du jet au premier signe d'un retour des symptômes d'une infection vésicale, si nécessaire.
- Encourager le patient à respirer profondément et à tousser, si nécessaire.
- Favoriser un apport nutritionnel approprié.
- Administrer un bolus liquidien, si nécessaire.
- Encourager le repos.
- Administrer les antibiotiques, si nécessaire.
- Administrer un agent immunisant, si nécessaire.
- Demander au patient de prendre les antibiotiques de la façon prescrite.
- Informer le patient et la famille des signes et symptômes de l'infection et les circonstances où ils doivent les signaler à la personne soignante.
- Enseigner au patient et aux membres de la famille comment éviter les infections.
- Favoriser la conservation et la préparation sans danger des aliments.